


Día nacional de concientización sobre el VIH/SIDA entre hombres gays y bisexuales

El 27 de Septiembre



En el 2016, había

999.447



personas que vivían con VIH en los Estados Unidos.



Entre las personas que viven con VIH en los Estados Unidos en el 2016,

más de la mitad

eran **hombres gays y bisexuales**.



Aquellas personas con VIH que toman sus medicamentos como se les indica y **mantienen la supresión del virus o es indetectable, no les pueden transmitir el VIH a sus parejas sexuales.**


Indetectable = Intrasmisible
#lequivaleal

En el 2017, en los Estados Unidos, **2 de 3 nuevos diagnósticos de VIH se encontraban entre hombres gays y bisexuales.**



El **93%** de los nuevos diagnósticos de VIH entre los jóvenes de 13 a 24 años en los Estados Unidos, eran **hombres gays y bisexuales**.

Los nuevos diagnósticos de VIH entre los jóvenes gays y bisexuales por raza/etnia son:



Los hombres gays y bisexuales deben hacerse la prueba de VIH al menos una vez al año. Algunos podrían beneficiarse al hacerse las pruebas con más frecuencias cada 3-6 meses.



Utilice un condón correctamente cada vez que sostenga relaciones sexuales para protegerse del VIH y de otras enfermedades de transmisión sexual.




Si eres seronegativo para el VIH, habla con tu médico sobre la **PrEP**. Una píldora diaria para prevenir el VIH.

VIH entre hombres gais y bisexuales en Luisiana



Casi la mitad de las personas que vivía con VIH en Luisiana en el 2018 era



hombres gais y bisexuales.

Entre los hombres gais y bisexuales que viven con VIH en Luisiana...

1 de 3 era menor de 35 años.


El 58% era negros, el 35% era blancos.

2 de 3 habían alcanzado la supresión del virus.



Durante los últimos 10 años, el porcentaje de nuevos diagnósticos de VIH entre hombre gais y bisexuales ha aumentado del 39% en el 2009 al 59% en el 2018.

Entre los nuevos diagnósticos de VIH en el 2018 en Luisiana, el 59% era hombres gais y bisexuales (HGB) y un 3% adicional era hombres gais y bisexuales que se inyectan con drogas.



1 de 3

HGB diagnosticados con el VIH era menor de 25 años.

2 de 3

HGB diagnosticados con el VIH eran negros.



Los hombres gais y bisexuales deben hacerse la prueba de VIH al menos una vez al año. Algunos podrían beneficiarse al hacerse las pruebas con más frecuencias cada 3-6 meses.



Utilice un condón correctamente cada vez que sostenga relaciones sexuales para protegerse del VIH y de otras enfermedades de transmisión sexual.



Si eres seronegativo para el VIH, habla con tu médico sobre la PrEP. Una píldora diaria para prevenir el VIH.

Para localizar los centros de pruebas e información sobre el VIH u otra infección de transmisión sexual ve al:



www.lahhub.org



@lahealthhub